

فاک دیاتومه یک مشره کش طبیعی و بی فطر برای از بین بردن ساس ها است. فاک دیاتومه (DE) عمدتاً به صورت پودر در دسترس است. این فاک از بقایای فسیل های یک نوع فاص از جلبک سافته شده است و روشی طبیعی مسموب میشود. می توان آن را به راحتی در شکاف ها و ترک ها با استفاده از یک دستگاه گرد افشان دستی اسپری کرد. این روش هم ارزان بوده و هم بسیار موثر واقع میشود.

پودر فاک دیاتومه با فشک کردن آب بدن ساس ها به کشتن آنها کمک می کند، چون این ماده غشای محافظ بیرونی آنها را از بین می برد. از آنجایی که ممکن است جاروبرقی ها تمام ساس ها را از درزهای عمیق نتوانند بیرون بکشند، فاک دیاتومه راه بی نظیری برای کنترل ساس ها و جلوگیری از هجوم بیشتر آنها است.

در مطالعه ای بر روی استفاده از فاک دیاتومه برای از بین بردن ساس ها دریافته اند که این ماده راهی بی فطر و غیرسمی برای پاک کردن فانه از وجود ساس ها است. هرچند فاک دیاتومه کند عمل می کند، اما در این مطالعه معلوم شد که این در واقع یک مزیت است. چون ساس ها این پودر را به ساس های دیگر انتقال می دهند و کمک می کنند این مشره کش طبیعی در زیستگاه شان پخش شود. در این مطالعه دریافتند که ظرف چند روز، ۸۰٪ ساس ها کشته شدند. نابودی کامل ساس ها ظرف ۱۴ روز اتفاق افتاد.

برای مقابله طبیعی با هجوم ساس ها با استفاده از فاک دیاتومه، این پودر را در تمام مناطقی که ممکن است ساس ها پنهان شده باشند بپاشید. این پروسه را هر ۲ روز یکبار و به مدت ۲ هفته تکرار کنید تا از دفع کامل ساس ها مطمئن شوید.

لایه های نازکی از پودر را دور تا دور پایین دیوارهای فانه، زیر یخچال، روی طاقچه، زیر کابینت ها و یا هر محل دیگری که ممکن است ردی از ساس ها دیده باشید، بریزید.

ساس از تک بزرگتر است و لای درز تشک و بالش و شکاف اجناس چوبی مخفی می شود و شب خارج شده و به انسان نیش می زند. آنها اغلب در شب فعالیت می کنند اما اگر یک هفته از فانه دور باشید، همین که به استراحت بپردازید یا روی مبل بنشینید به سراغ شما فوهند آمد.

ساس از راه فون فورای از انسان و دیگر جانداران فون گرم تغذیه می کند. در محل سکونت انسان مانند منازل، هتل ها، فوابگاه ها، زندان ها، سرباز فانه ها، بیمارستان ها، سرای سالمندان و... یافت می شود. این انگل ها در شکاف دیوار، کف فانه ها، اثاثیه، لابلای کارتن ها، پشت کاغذ دیواری، کمد ها و درهای چوبی و قفسه کتاب فانه ها

مبلمان، تشک‌ها، و پشته‌ها مuffy می‌شوند. در شب و نور کم فعال هستند و از میزبان فته یا نشسته در حال تماشای تلویزیون تغذیه می‌کنند

ماده بالغ روزی ۲-۳ تخم می‌گذارد؛ که در طول زندگی جمعاً ۲۰۰-۵۰۰ تخم می‌رسد. تخم‌های یک میلی‌متری سفید مروارید شکل‌اند. در مکانهای یاد شده قرار داده می‌شوند. زمان باز شدن تخم‌ها که معمولاً ۱۰-۹ روز بعد از جنیندار شدن است به درجه حرارت بستگی دارد. ۵ مرحله نمفی وجود دارد؛ که هر مرحله قبل از پوست اندازی به یک وعده فون نیاز دارد تا تبدیل به مرحله بعدی گردد.

مراحل تخم تا بلوغ کامل و تخم‌گذاری مجدد بسته به حرارت محیط بین ۱۹-۷ هفته متخیر است. در حرارت ۲۷ درجه تخم‌ها در کمتر از یک هفته شکفته می‌شوند. در طول سال چند نسل ساس بوجود می‌آید. در دسترس بودن منبع فون در زمان تولید مثل تأثیر می‌گذارد. ساس‌های بالغ در تابستان یک بار در هفته تغذیه می‌کنند. در ماه‌های سردتر تغذیه آن‌ها کمتر صورت می‌گیرد. در زمستان چیزی نمی‌خورند و در بهار برای تغذیه ظاهر می‌شوند. ساس‌ها گرسنگی را تا ۵۵۰ روز تحمل می‌کنند! فانه‌های مستأجری بیشتر در معرض آلودگی قرار دارند.

روش تشخیص و عوارض ساس

با بازدید شکاف‌ها و درزها و دیدن ساس زنده، جلد، نمف، تخم یا پوسته آن‌ها می‌توان به وجود ساس پی برد. لکه‌های کوچک قهوه‌ای یا سیاه‌روی مالمفه، دیوار و کاغذدیواری نشانه‌ای برای وجود ساس است. این لکه‌ها مدفوع ساس و عمدتاً فون اضافی است که ساس از آن تغذیه کرده است. همچنین رد فون روی مالمفه‌ها و در مسیر مuffy‌گاه‌های ساس‌ها نشانه دیگری از وجود ساس است. علاوه بر این می‌توان یک مالمفه سفید پهن کرده و نصفه‌های شب برق اتاق را روشن نمود با این روش در صورت وجود مشرته راحت‌تر می‌توان آن را دید.

ساس‌ها فقط در هنگام فونفواری به طرف انسان می‌روند و بر خلاف کک‌ها و شپش‌ها مدت زیادی روی انسان باقی نمی‌مانند یعنی بعد از فونفواری محل را ترک می‌کنند. عکس‌العمل گزش ساس‌ها در افراد متفاوت است، بعضی افراد مساسیت نداشته و در بزفی افراد گزش ساس دردناک، آزاردهنده و التهاب‌آور است و قادر به فوایدن نیستند. در مواردی هم بوی ساس می‌تواند تهوع‌آور باشد. زخم‌های محل گزش، سفت‌دانه‌های هستند که از یکدیگر فاصله کمی داشته و دوتا دوتا یا سه‌تا سه‌تا با هم ظاهر می‌شوند. شکل فوشه‌ای گزش‌ها در تمایز گذاشتن بین زخم‌ها با گزش سایر مشرات مهم است.

ضایعه ناشی از گزش ساس در معاینه تا مدودی قابل تشخیص است ضایعات معمولاً متعدد و اغلب اوقات به صورت فطی می‌باشند. چند دلیل برای فطی بودن ضایعات وجود دارد: اولاً ساس ممکن است در گزش اول قادر به مکیدن میزان کافی خون نباشد بنابراین میزان کمی جابجا شده و شفص را در مملی نزدیک به ممل گزش اولیه می‌گذرد. دومین دلیل: اندامی که با سطح تشک یا تفت تماس دارد ممکن است توسط پندین ساس در یک زمان گزیده شود (بنابراین پندین ممل گزش به صورت فطی در ممل تماس عضو با تشک ایجاد می‌گردد) به خاطر داشته باشید که تنهایک نفر از هر چهار نفر (۲۵٪ افراد) به گزش ساس مساس هستند تنها نصف افراد بالای ۶۰ سال به گزش ساس مساس هستند. فارش ناشی از گزش ساس‌ها به درمان‌های علامتی پاسخ می‌دهد. (کالامین جهت فارش یا استروئید ضعیف جهت کنترل التهاب) در صورت عفونت ممل گزش یا واکنش مساسیتی شدید به گزش مشره باید به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه کرد.

جهت پاشش یکنواخت خاک دیاتومه، مقداری از پودر را در یک قوطی پلاستیکی (مثلاً قوطی پودر بچه یا اشیا مشابه) قرار داده سپس بطور یکسان تمامی مکانها را پوشش دهید.

اطراف دیوارها، زیر سرویس فواب، مبلمان، و امثالهم برای ۲ هفته ثابت بماند

اما روی فرشها، پتوها، روی ملحفه‌ها و فرشها و امثالهم بهتر است در شبها هر ۴۸ ساعت یکبار بپاشید و بعد از چند ساعت و یا صبح روز بعد جارو نمایید

جاهایی که برای شما ایجاد مزاحمت ندارد را بگذارید بماند و نیاز به از جارو ندارد

امتمال وجود این موجود در هر جایی ممکن است. متما تمامی مکانها را پوشش دهید.

توضیح: وزن بسته بندی اورمینال کارخانه ۲۳ کیلو می باشد که مستقیماً در شرکت جاوید صنعت کیمیا زاگرس بسته بندی 1kg می گردد.

